




КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПАЦИЕНТОК ИЗ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ





**Материал основывается на данных, предоставленных врачами-онкологами
и полученных ими в результате врачебной практики.
ООО «Новартис Фарма» не несет ответственности за достоверность данных,
использованных в материале.**



Клинический случай

Значительное уменьшение болевого синдрома у пациентки с РРМЖ, принимающей рибоциклиб

Андреас Харткопф

Клинический случай

Анамнез

Цель и план лечения

Лечение и наблюдение

Мониторинг

Результат

Заключение

АНАМНЕЗ


- **Г-жа Х.:**
57 лет, 2 детей (оба младше 20 лет), обратилась к врачу с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника.
- По данным МРТ поясничного отдела позвоночника выявлены образования, с большой вероятностью соответствующие метастатическому поражению костей.
- При пальпации молочных желез было выявлено уплотнение в левой молочной железе, которое пациентка игнорировала в течение нескольких месяцев, г-же Х. рекомендовали более углублённое обследование.



Клинический случай

Значительное уменьшение болевого синдрома у пациентки с РРМЖ, принимающей рибоциклиб

Андреас Харткопф



ОБСЛЕДОВАНИЕ И ДИАГНОЗ

- **Клиническое обследование молочных желёз:**
пальпируется уплотнение в левой молочной железе (диаметром 2 см), пальпируются увеличенные аксиллярные лимфатические узлы слева
- **Анализ крови:**
клинически значимых отклонений нет
- **Опухолевые маркеры:**
клинически значимых отклонений нет
- **УЗИ левой молочной железы:**
образование размером 1,7 см в левой молочной железе, метастатически измененные аксиллярные лимфатические узлы слева (уровень I и II)
- **КТ, МРТ поясничного отдела позвоночника:**
метастатическое поражение позвонков ниже-грудного и поясничного отделов позвоночника, без признаков патологических переломов. Висцеральные метастазы отсутствуют.
- **Биопсия и иммуногистохимический анализ:**
биопсия образования в левой молочной железе: инвазивный рак молочной железы неспецифического типа, ER-положительный (100%), PR-отрицательный (0%), HER2-отрицательный (1+)
- **Оценка по шкале ECOG-ВОЗ:**
1
- **Генетическое секвенирование:**
данные недоступны
- **ДИАГНОЗ:**
первичный метастатический (метастазы в кости) люминальный, HER2-отрицательный рак левой молочной железы



Клинический случай

Значительное уменьшение болевого синдрома у пациентки с РРМЖ, принимающей рибоциклиб

Андреас Харткопф



ЦЕЛЬ И ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ

- **Лечение:**
летрозол 2,5 мг/сутки + рибоциклиб 600 мг/сутки (с 1-го по 21-й дни, цикл 28 дней) + 120 мг деносумаб для подкожного введения (в течение 28 дней)²
- **Сопутствующие препараты:**
Ибупрофен 600 мг при необходимости
- **Продолжительность лечения:**
до прогрессирования заболевания или непереносимой токсичности²
- **Мониторинг состояния пациентки:**
общий и биохимический анализ крови каждые две недели в течение первых двух циклов, далее – каждые четыре недели²
- **Оценка опухоли:**
КТ и ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных зон каждые 12 недель
ЭКГ каждые две недели в течение первого цикла приёма рибоциклиба¹



Клинический случай

Значительное уменьшение болевого синдрома у пациентки с РРМЖ, принимающей рибоциклиб

Андреас Харткопф



НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА


- Уменьшение размера опухоли в левой молочной железе (до 0,8 см) и лимфоузла в левой аксиллярной области
- **Анализ крови:**
нейтропения II степени
- **Опухолевые маркеры:**
клинически значимых отклонений нет
- **КТ-сканирование:**
ранее описанных костных метастазах, новых очагов нет
- **Оценка по шкале ECOG-ВОЗ:**
0
- **Генетическое секвенирование:**
данные недоступны
- **Побочные эффекты:**
нейтропения II степени, усталость I степени²



Клинический случай

Значительное уменьшение болевого синдрома у пациентки с РРМЖ, принимающей рибоциклиб

Андреас Харткопф



МОНИТОРИНГ


- **Общий ответ:**
положительный ответ на основании уменьшения интенсивности боли через 7 недель, полная отмена обезболивающих, полная отмена обезболивающих
- **Нежелательные явления:**
отсутствуют, кроме нейтропении от лёгкой до умеренной степени
- **Качество жизни:**
высокое
- **Оценка по шкале ECOG-ВОЗ:**
0
- **Влияние на работу, хобби, повседневную деятельность:**
на текущий момент отсутствует
- **Отзыв пациентки:**
пациентка снова может улыбаться и смеяться



Клинический случай

Значительное
уменьшение
болевого
синдрома у
пациентки
с РРМЖ,
принимающей
рибоциклиб

Андреас Харткопф



РЕЗУЛЬТАТ

- Боли в спине у г-жи Х. значительно уменьшились. Она редко принимает нестероидные противовоспалительные препараты.
- На данный момент пациентка получает комбинированную эндокринную терапию рибоциклиб/деносумаб в течение 17 месяцев.
- Качество её жизни сохраняется на высоком уровне.



Клинический случай


Значительное
уменьшение
болевого
синдрома у
пациентки
с РРМЖ,
принимающей
рибоциклиб

Андреас Харткопф



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Рибоциклиб у данной пациентки обеспечивает долгосрочный контроль заболевания, одновременно уменьшая болевые ощущения (в частности, из-за костных метастазов) и сохраняя качество жизни.



Назад
к результатам



Клинический случай

Клинический
случай

Анамнез

Цель и план
лечения

Лечение
и наблюдение

Мониторинг

Результат

Заключение



1. Hortobagyi GN et al. Annals of Oncology 29: 1541–1547, 2018.

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Рисарг ЛП – 004670 от 26.08.2020. Электронный ресурс <https://grls.rosminzdrav.ru/> от 13.11.2020

